

Grippe saisonnière 2012

Le vaccin disponible en pharmacie dès le 28 septembre

Le GEIG lance un appel à mobilisation pour la vaccination des personnes à risque

L'hiver dernier a été marqué par un taux de mortalité particulièrement important chez les personnes âgées, au moment de la vague de froid et de l'épidémie de grippe et dans un contexte de faible taux de vaccination contre la grippe : près de 6 000 décès soit 13% de plus que la moyenne habituelle entre le 6 février et le 18 mars dernier¹.

Le Groupe d'Expertise et d'Information sur la Grippe (GEIG) rappelle l'objectif de santé publique des autorités concernant la grippe : atteindre 75% de vaccination antigrippale chez les personnes âgées de 65 ans et plus et toutes les populations à risque. Ce niveau de couverture vaccinale doit permettre de réduire significativement l'impact de la grippe dans ces populations.

Meilleur moyen de se prémunir efficacement contre la grippe, le vaccin sera disponible dans toutes les pharmacies dès le 28 septembre.

Encore trop de personnes à risque qui s'ignorent !

Si chaque année, les épidémies de grippe peuvent toucher tous les groupes d'âge, le plus haut risque de complications concerne **les enfants de moins de deux ans, les femmes enceintes, les adultes de 65 ans ou plus et toutes les personnes présentant une maladie chronique** respiratoire, cardiaque, rénale, hépatique, sanguine ou métabolique (diabète), ou un affaiblissement du système immunitaire (ref Calendrier vaccinal 2012 – BEH n° 14-15, 10 avril 2012). Or, beaucoup d'entre elles considèrent encore la grippe comme une maladie bénigne et négligent de se faire vacciner.

Les résultats du baromètre Kantar Health sur la couverture vaccinale de l'hiver 2011/2012² illustrent cette situation et montrent une désaffection avec une **nette baisse du taux de couverture vaccinale des personnes à risque**. Seules 50 % d'entre elles se sont fait vacciner l'hiver dernier, soit une baisse de **4% par rapport à la saison précédente**.

- Seuls 43% des moins de 65 ans souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) se sont fait vacciner contre la grippe (vs 68% la saison précédente),
- 36% de celles souffrant d'une Affection Longue Durée (vs 42%),
- 21% des moins de 65 ans asthmatiques (vs 23%).

Le GEIG rappelle **l'importance de la vaccination annuelle de tous les patients à risque.**

**Pour toutes ces personnes, le vaccin est pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie ;
la campagne de vaccination antigrippale dure jusqu'au 31 janvier 2013.**

¹ BEH 4 septembre 2012 / n°33

² Etude menée en mars et avril 2012 auprès de 4717 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus,

Des personnes âgées et des personnels soignants sous-vaccinés

Même si le taux de couverture vaccinale chez les 65 ans et plus est de loin le plus important (62% vs 21% chez les 50-64 ans), il a connu une baisse de près de 10 points en 2 ans, passant de 71% à 62% cet hiver. Cette baisse concerne plus particulièrement les 70-74 ans (-12%) et les 65-69 ans (-10%) ; la tranche des 75 ans et plus est celle qui a connu la moins forte chute (-5%) et constitue la tranche ayant la meilleure couverture vaccinale (68%).

Il en est de même pour l'ensemble des professionnels de santé qui ne sont que 25% à s'être fait vacciner l'hiver dernier, en baisse de 7% par rapport à l'hiver 2009/2010. Il est préoccupant de voir que les professionnels de santé n'ont pas été davantage vaccinés que la moyenne de la population française.

La vaccination antigrippale est pourtant recommandée pour les personnels soignants. Elle est prise en charge à 100 % pour tous les professionnels de santé libéraux en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque de grippe sévère : médecins généralistes, infirmiers, sages-femmes, pédiatres, pharmaciens titulaires d'officine, masseurs-kinésithérapeutes. Comme la désinfection des mains, la vaccination antigrippale fait partie des mesures d'hygiène de base que chaque personnel soignant doit appliquer dans le cadre de sa pratique professionnelle. En étant vacciné, il protège sa patientelle.

Le moyen le plus efficace de se prémunir de la grippe est la vaccination. Des vaccins sûrs et efficaces existent et sont utilisés depuis plus de 60 ans. Chez les personnes âgées, la vaccination permet de réduire significativement la gravité de la maladie et ses complications, y compris la mortalité.

Composition du vaccin 2012/2013

Pour la saison 2012/2013, l'analyse de la situation épidémiologique de la grippe observée depuis l'automne a conduit les virologues des centres collaborateurs de référence pour la grippe à recommander les 3 souches de virus grippaux suivants pour la fabrication du vaccin destiné aux pays de l'hémisphère nord :

A/California/7/2009 (H1N1), inchangée

A/Victoria/361/2011 (H3N2), nouveau

B/Wisconsin/1/2010, nouveau

www.grippe-geig.com

Contact presse pour le GEIG : Laurence de la Touche –The Desk – 01 49 24 58 43 – l.delatouche@thedesk.fr